


Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



| Regione Toscana | anno 2012 | anno 2013 | anno 2014 | anno 2015 | anno 2016 | 2012-2016 | Inflazione 2012-2016 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| Numero ricette | 38.102.071 | 38.644.169 | 38.612.433 | 37.537.514 | 36.801.166 | -3.4% | 1,1% |
| Spesa lorda | 614.775.647 | 598.143.557 | 586.411.851 | 584.053.768 | 576.533.359 | -6.2% | |
| Spesa netta | 502.366.344 | 500.440.568 | 486.126.758 | 480.352.092 | 468.719.954 | -6.7% | |

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Toscana: confronto 2016/2015

| Gruppo ATC | incidenza su spesa 2016 | diff. rispetto spesa 2015 | incidenza sul n. confezioni 2016 | diff. rispetto confezioni 2015 |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| sistema cardiovascolare | 31,56% | -2,09% | 35,22% | -0,94% |
| apparato gastrointestinale e metabolismo | 18,30% | -2,68% | 21,81% | -1,75% |
| sistema nervoso | 14,06% | -0,77% | 10,92% | -1,89% |
| sistema respiratorio | 10,96% | -3,69% | 3,60% | -4,41% |
| antimicrobici generali per uso sistemico | 7,69% | -6,98% | 7,62% | -7,26% |
| sistema genito-urinario ed ormoni sessuali | 4,48% | -0,48% | 3,64% | -2,97% |
| sistema muscolo-scheletrico | 3,62% | -5,50% | 3,63% | -4,38% |
| organi di senso | 3,31% | +1,55% | 2,04% | +0,21% |
| sangue ed organi emopoietici | 2,86% | +8,48% | 6,97% | -3,15% |
| preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline | 2,03% | +13,11% | 3,78% | -3,65% |

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Toscana

| Principio attivo | incidenza su spesa 2016 | diff. rispetto spesa 2015 |
|--|-------------------------|---------------------------|
| pantoprazolo sodico sesquidrato | 2,61% | -8,70% |
| lansoprazolo | 2,52% | -8,75% |
| salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato | 2,22% | -23,16% |
| amoxicillina triidrato/potassio clavulanato | 2,01% | -3,97% |
| rosuvastatina sale di calcio | 1,86% | -1,55% |
| colecalfiferolo | 1,73% | +25,90% |
| ramipril | 1,70% | -5,37% |
| atorvastatina calcio triidrato | 1,60% | +4,43% |
| dutasteride | 1,53% | +0,92% |
| beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato | 1,42% | +6,16% |

I 10 principi attivi più prescritti in Toscana

| Principio attivo | incidenza sul n. confezioni 2016 | diff. rispetto confezioni 2015 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| pantoprazolo sodico sesquidrato | 3,75% | -3,55% |
| ramipril | 3,64% | -0,71% |
| lansoprazolo | 3,64% | -5,65% |
| acido acetilsalicilico | 3,09% | -3,38% |
| metformina cloridrato | 2,96% | -0,48% |
| colecalfiferolo | 2,46% | +14,23% |
| amlodipina besilato | 2,10% | -0,68% |
| furosemide | 2,01% | -1,07% |
| amoxicillina triidrato/potassio clavulanato | 1,86% | -4,34% |
| simvastatina | 1,77% | -3,45% |